

## La fonction logarithme népérien

### I Rappels sur la fonction exponentielle



#### Définition : Existence et unicité de la fonction exponentielle

Il existe une **unique** fonction  $f$  définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que

$$f(0) = 1 \text{ et } f' = f$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**. On la note  $x \mapsto \exp(x)$  ou  $x \mapsto e^x$  (où  $e = \exp(1) \approx 2,72$ ).



#### Propriété : Variation et signe


- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x > 0$ .
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .



#### Propriété : Propriétés algébriques

Pour tous  $a \in \mathbb{R}$ ,  $b \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ ,

1.  $e^{a+b} = e^a \times e^b$
2.  $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
3.  $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
4.  $(e^a)^n = e^{na}$



Courbe représentative



#### Propriété : Croissances comparées

Pour tout entier naturel  $n$  on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$$

### II La fonction logarithme népérien



#### Définition : Logarithme népérien

Le **logarithme népérien** du réel positif non nul  $a$  est la solution de l'équation  $e^x = a$ . On la note  $\ln(a)$ . La fonction logarithme népérien est la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $\ln : x \mapsto \ln(x)$ .

#### Remarques

- Il s'agit de la **fonction réciproque** de la fonction exponentielle. En effet  $e^{\ln(x)} = x$  pour  $x > 0$  et  $\ln(e^x) = x$  pour  $x \in \mathbb{R}$ . En particulier  $\ln(1) = 0$  et  $\ln(e) = 1$ .
- En sciences et en particulier en chimie, on utilise la fonction **logarithme décimal** notée  $\log$ , qui est la réciproque de la fonction  $x \mapsto 10^x$ . Elle est définie par  $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$ .



**Propriété : Propriétés algébriques de la fonction logarithme**

Pour tous réels  $a$  et  $b$  strictement positifs et tout  $m \in \mathbb{Q}$ ,

1.  $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$

3.  $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$

2.  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

4.  $\ln(a^m) = m \times \ln(a)$

### III Étude de la fonction logarithme



**Propriété : Dérivabilité de la fonction logarithme**

La fonction logarithme népérien est **continue** et **dérivable** sur  $]0; +\infty[$  et pour tout réel  $x > 0$ ,

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

Si  $u$  est une fonction définie et strictement positive sur un intervalle  $I$  alors  $\ln \circ u$  est dérivable sur  $I$  et

$$(\ln \circ u)' = \frac{u'}{u}$$



**Propriété : Variations de la fonction logarithme**

La fonction logarithme népérien est **strictement croissante** sur  $]0; +\infty[$ .

— Conséquences —

Pour tous réels  $a > 0$  et  $b > 0$ ,

—  $\ln(a) = \ln(b)$  si et seulement si  $a = b$

—  $\ln(a) \leq \ln(b)$  si et seulement si  $a \leq b$




**Propriété : Limites en 0 et  $+\infty$  de la fonction logarithme népérien**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

**Représentation graphique** : La courbe de la fonction logarithme népérien admet une asymptote verticale d'équation  $x = 0$ .

$x$	0	1	$+\infty$
$\ln(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$



**Propriété : Croissances comparées**

Pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = 0$$